



ELJÁRÁSREND AZ ALLERGIÁVAL KÜZDŐ GYERMEKEK ELLÁTÁSÁRÓL

Óbudai Hétpettyes Óvoda



Eljárásrend az allergiás tünetek, rohamok ellátására

Rajtunk pedagógusokon múlik, hogyan biztosítjuk a súlyos életveszélyes allergiával küzdő gyermekek intézményben való tartózkodását és biztonságát.

A még nem diagnosztizált esetek 20%-ánál az első anafilaxiás roham a közoktatási intézményekben történik.

Az anafilaxiás roham percekben belül juttathatja életveszélyes állapotba a gyermeket.


Intézményi protokollnak tartalmaznia kell, mit kell tenni ha anafilaxiás gyermek iratkozik be az intézménybe.

A legnagyobb odafigyelés mellett is előfordulhat, hogy a gyermek allergént tartalmazó ételt fogyaszt. Az ilyen esetekre is fel kell készülni. Az első és legfontosabb, hogy ismerjük az allergiás reakció jeleit, melyek az étel fogyasztását követően néhány perccel, vagy órával később is jelentkezhetnek.

Ha a gyermekén kiütések, bőrpír jelentkezik, esetleg a szájában tapasztal égő, viszkető érzést, nyelve, ajkai megduzzadnak, hányinger, hányás, hasmenés, rossz közérzet alakul ki, azonnal hívunk orvosi segítséget, mentőt. A kezdetben enyhének látszó tünetek rövid időn belül súlyos, akár életveszélyes állapot kialakulásához is vezethetnek.

Az óvodában az EpiPen Junior injekció áll rendelkezésre gyorsan mindenki által ismert erre kijelölt helyen.

Az EpiPen junior rovarcsípések, ételek, gyógyszerek vagy egyéb allergének által kiváltott súlyos allergiás reakciók (anafilaxia) kezelésére alkalmazható.



Anafilaxia

Vannak olyan allergiás esetek –beleértve az ételallergiát és a rovarcsípést is- megvan annak a lehetősége, hogy komoly reakciót indít be, amely az anafilaxia. Az anafilaxia egy életveszélyes helyzet, mely során sokkot kaphat a beteg. Az anafilaxia tünetei és jelei a következők lehetnek:

- eszméletvesztés
- feledékenység
- légzéskimaradás
- gyors, gyenge pulzus
- bőrkiütés
- émelygés, hányás
- légúti duzzanatok, melyek gátolhatják a légzést

Az EpiPen Junior alkalmazása:

15-30kg közötti testtömegű gyermek számára alkalmas.

Ha akkut allergiás reakció jelei észleljük, azonnal alkalmazzuk.

A beadás módja:

Az EpiPen Junior-t úgy tervezték, hogy egészségügyi képzettséggel nem rendelkező személy is könnyen használni tudja. Az injekciót határozottan a comb külső részébe adjuk kb 10cm távolságból. Amikor határozottan odanyomjuk a gyermek combjához az injekciót, egy rugó által aktivált dugattyú lép működésbe, amely a rejtett tűt a combizomba döfi és bejuttatja az adrenalin adagot. Az EpiPen Juniorral ruhán keresztül is lehet injekciózni.

Az EpiPen Juniort KIZÁRÓLAG A COMB KÜLSŐ RÉSZÉBE SZABAD INJEKCIÓZNI!!

FAR IZOMBA NEM ADHATÓ!

Az óvoda kijelölt gyermek orvosa illetve a területileg illetékes védőnő évente ismétlődő oktatást tart óvodánk pedagógusainak az anafilaxiás rohamok felismeréséről és kezeléséről, ill. lehetséges protokollváltozásokról.

2022. 09. 01.



Mu Pa

